


# WEBINAR by sefh

## III JORNADA DE CONTROVERSIAS EN FARMACIA NEUROPSIQUIÁTRICA



### **Controversias en la utilización de antipsicóticos en Geriatría**

Gloria M Hervás leyva,  
S de Farmacia, C.penitenciario de Albolote (Granada)



ORGANIZA



En la edad avanzada es el período de la vida en que es más frecuente encontrar síntomas psicóticos: delirios, alucinaciones, suspicacia, hostilidad, agitación...

La etiología puede ser muy diversa:

Esquizofrenia

Trastornos cognitivos en todas sus variantes

Trastorno delirantes

Depresión psicótica

Trastornos bipolares y esquizoafectivos

Psicosis secundarias a causas médicas y farmacológicas

(La prevalencia global alcanza un 4% , aunque en las residencias este dato se ve muy incrementado puede alcanzar un 21%)

Preocupa el consumo de antipsicóticos en esta población que es especialmente elevado en los centros geriátricos y que como vamos a ver a continuación presenta ciertas **complicaciones**

El clínico

El paciente

El tratamiento



ORGANIZA



WEBINAR

III JORNADA DE CONTROVERSIAS  
EN FARMACIA NEUROPSIQUIÁTRICA

Presenta una gran complejidad

- 1.- Los **fenómenos psicóticos** a menudo son graves , persistentes en el tiempo, producen un gran sufrimiento al paciente y a su entorno, no suelen remitir espontáneamente
- 2.- Hay que añadir que en los ancianos suele sumarse otras **causas de incapacidad**, como son las enfermedades neurológicas o cardiopatías
- 3.- Estos pacientes suelen presentar **déficit sensoriales y aislamiento social**
- 4.- Normalmente están **polimedicados**



ORGANIZA

sefh  
Sociedad Española  
de Farmacia Hospitalaria

fehf  
Fundación Española  
de Farmacia Hospitalaria

neuropsiquiatría

WEBINAR

III JORNADA DE CONTROVERSIAS  
EN FARMACIA NEUROPSIQUIÁTRICA

## El tratamiento

Requiere un **abordaje integral**, que combine intervenciones sociales, comportamentales y de modificación del ambiente,

Cuando las medidas no farmacológicas son insuficientes, los antipsicóticos, AP, constituyen el tratamiento de base para de éstos pacientes

Pero los AP presentan algunos **inconvenientes**:

1.- presentan riesgos iatrogénicos importantes en la población anciana

2.-Pocos ensayos clínicos en la población geriátrica

Especialmente en demencias y delirium, que cuentan con escasa evidencia

científica y por tanto suele usarse fuera de indicación

# El clínico

El prescriptor se encuentra ante una situación complicada:...

- 1.- Frente a la **alta demanda** de ayuda por parte de los enfermos, familiares y/cuidadores
- 2.- hay un **paciente deteriorado que es muy vulnerable a la toxicidad** de los fármacos:  
requiere ajuste de dosis, estrecha vigilancia de efectos adversos e interacciones ...
- 3.- una **prescripción** que en determinados usos está sujeta a **restricciones**

Un escenario complejo....

