Estrategias para la prevención de cardiotoxicidad en supervivientes de cáncer pediátrico

Blanca Herrero Velasco

Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús

Madrid

Introducción

- Avances en el tratamiento → **Aumento Supervivencia**
- Oncología pediátrica
 - 80 % supervivencia a 5 años
 - 75% a 10 años
- **Aumento de complicaciones tardías**
 - Enfermedades crónicas
 - Discapacidad
- Población infantil → más susceptible

Introducción

Factores predisponentes para complicaciones a largo plazo

- Enfermedad de base
- Tratamiento recibido
- Predisposición genética
- Comorbilidades
- Estilo de vida

Introducción

Efectos tardíos en supervivientes de cáncer infantil

- 3 de cada 4 supervivientes presentarán al menos una complicación crónica del tratamiento
- Más de 1/4 de los casos son complicaciones graves o amenazantes para la vida

Riesgo cardiovascular en supervivientes de cáncer infantil

- Los tratamientos oncohematológicos **triplican el riesgo** de eventos cardiovasculares a medio y largo plazo
- Las enfermedades cardiovasculares son la **principal causa morbimortalidad** no oncológica
- Es un riesgo multifactorial: riesgo específico + población general
- Reducción dosis de radioterapia y de quimioterapia cardiotoxica
- Nuevos tratamientos presentan un potencial riesgo cardiovascular
- La mortalidad por enfermedad cardiovascular, según distintos estudios aumenta en los estudios con respecto a la población general (1.9 a 12.7)

Riesgo cardiovascular en supervivientes de cáncer infantil

Groarke, European Heart Journal (2018) 39, 1563–1566

Cardiotoxicidad en supervivientes de cáncer infantil

- **Antracíclicos**
- Sexo femenino
- Corta edad
- **Irradiación mediastínica**
- HTA
- Quimioterapia
Ciclofosfamida, ifosfamida, actinomicina,
bleomicina, metotrexato, vincristina

Cardiotoxicidad en supervivientes de cáncer infantil

Antraciclinas

Recomendación para reducción toxicidad:

- Seguimiento cardiológico
- NO sobrepasar 450 mg/m² doxorubicina
- Formas liposomales
- Desrazoxano

- **Riesgo de disfunción cardíaca asintomática del 57% a 6.4 años**

Cardiotoxicidad en supervivientes de cáncer infantil

Radioterapia

Recomendación para reducción toxicidad:

- Seguimiento cardiológico
- Ajuste de dosis recibida en mediastino
- Ajuste del campo

Cardiotoxicidad en supervivientes de cáncer infantil

Efectos cardiovasculares de los medicamentos para la quimioterapia.

Solon, nsuf Card 2017; (Vol 6) 3:131-143

Riesgo cardiovascular en supervivientes de cáncer infantil

Hipertensión Arterial

- **Subclínica**
- **> 140 mmHg TAS Y > 90** diastólica, infra diagnostican la población en riesgo
- *St Jude Life* 33% cifras pre hipertensiva, un factor de riesgo para HTA futura
- Asociado a Nefrectomía y alteración de la función renal

Riesgo cardiovascular en supervivientes de cáncer infantil

Alteraciones metabólicas

Recomendación para reducción de toxicidad:

- Control de peso, perímetro abdominal
- Control de Tensión Arterial
- Cuantificación anual de lípidos

St Jude lifetime mostró una prevalencia S Metabólico de hasta un 36%

Riesgo cardiovascular en supervivientes de cáncer infantil

Estudios principales

ESC
European Society of Cardiology

European Heart Journal (2018) 39, 1555–1562
doi:10.1093/eurheartj/ehy026

CLINICAL RESEARCH
Prevention and epidemiology

Burden of cardiovascular risk factors and cardiovascular disease in childhood cancer survivors: data from the German CVSS-study

J. Faber^{1,6†}, A. Wingerter^{1†}, M.A. Neu¹, N. Henninger¹, S. Eckerle¹, T. Münzel^{2,3}, K.J. Lackner⁴, M.E. Beutel⁵, M. Blettner⁶, W. Rathmann⁷, A. Peters^{8,9,10}, C. Meisinger^{9,11}, B. Linkohr⁹, H. Neuhauser^{12,13}, P. Kaatsch¹⁴, C. Spix¹⁴, A. Schneider⁵, H. Merzenich⁵, M. Panova-Noeva^{15,16}, J.H. Prochaska^{3,15,16,17}, and P.S. Wild^{3,15,16,17}

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev: 2017 December ; 26(12): 1705–1713. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-17-0510.

Blood pressure status in adult survivors of childhood cancer: A report from the St. Jude Lifetime Cohort Study

Todd M. Gibson¹, Zhenghong Li¹, Daniel M. Green¹, Gregory T. Armstrong¹, Daniel A. Mulrooney², DeoKumar Srivastava³, Nickhill Bhakta⁴, Kirsten K. Ness¹, Melissa M. Hudson², and Leslie L. Robison¹

¹Department of Epidemiology and Cancer Control, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, TN 38105

²Department of Oncology, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, TN 38105

³Department of Biostatistics, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, TN 38105

⁴Department of Global Pediatric Medicine, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, TN 38105

Cardiac Outcomes in Adult Survivors of Childhood Cancer Exposed to Cardiotoxic Therapy: A Cross-Sectional Study from the St. Jude Lifetime Cohort

Daniel A. Mulrooney, MD, MS^{1,2,3}, Gregory T. Armstrong, MD, MSCE³, Sujuan Huang, MSPH³, Kirsten K. Ness, PT, PhD³, Matthew J. Ehrhardt, MD, MS¹, Vijaya M. Joshi, MD², Juan Carlos Plana, MD⁴, Elsayed Z. Soliman, MD, MSc, MS⁵, Daniel M. Green, MD³, Deokumar Srivastava, PhD⁶, Aimee Santucci, PhD³, Matthew J. Krasin, MD⁷, Leslie L. Robison, PhD³, and Melissa M. Hudson, MD^{1,3}

1

Riesgo cardiovascular en supervivientes de cáncer infantil

Estudios principales

CCSS Cardiovascular Risk Calculator

- Incidencia mayor de HTA (25%) y dislipemia (>60%)
- Enfermedad cardiovascular aparece antes (8 años)
- Riesgo relativo de enfermedad cardiovascular se duplica
- Evaluación con *strain* identificó disfunción cardíaca en 1/3 de los pacientes con FEVI normal

Riesgo cardiovascular en supervivientes de cáncer infantil

Ejercicio físico

- El ejercicio físico ha demostrado disminuir la morbimortalidad en supervivientes de cáncer infantil
- En el registro de *St Jude life* 30% no cumplía las recomendaciones y tenían 2 veces más riesgo de síndrome metabólico
- El ejercicio ha disminuido la cardiotoxicidad inducida por antracíclicos en modelos de ratones

Ideas para casa

- Los supervivientes de cáncer infantil presentan efectos tardíos
- La toxicidad cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad
- Factores de riesgo asociados a cardiotoxicidad fundamentalmente antraciclinas y radioterapia torácica
- Estratificación del riesgo cardiovascular para monitorización de los supervivientes
- Importancia de minimizar la toxicidad de los tratamientos. Precisan seguimiento de por vida
- Fundamental la educación para estilos de vida saludable

Jornada de Actualización en onco-hematología pediátrica para farmacéuticos de hospital

Bibliografía

1. Pluimakers, V.G., et al., Metabolic syndrome as cardiovascular risk factor in childhood cancer survivors. *Crit Rev Oncol Hematol*, 2019. 133: p. 129-141.
2. Denlinger, C.S., et al., Survivorship, Version 2.2018, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. *J Natl Compr Canc Netw*, 2018. 16(10): p. 1216-1247.
3. Chow, E.J., et al., Paediatric cardio-oncology: epidemiology, screening, prevention, and treatment. *Cardiovasc Res*, 2019. 115(5): p. 922-934.
4. Gibson, T.M., et al., Blood Pressure Status in Adult Survivors of Childhood Cancer: A Report from the St. Jude Lifetime Cohort Study. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*, 2017. 26(12): p. 1705-1713.
5. Armstrong, G.T., et al., Modifiable risk factors and major cardiac events among adult survivors of childhood cancer. *J Clin Oncol*, 2013. 31(29): p. 3673-80.
6. Mulrooney, D.A., et al., Cardiac Outcomes in Adult Survivors of Childhood Cancer Exposed to Cardiotoxic Therapy: A Cross-sectional Study. *Ann Intern Med*, 2016. 164(2): p. 93-101.
7. Lee, S.J. and N.C. Kim, Association Between Sarcopenia and Metabolic Syndrome in Cancer Survivors. *Cancer Nurs*, 2017. 40(6): p. 479-487.
8. Chen, S.S.J., et al., Evaluating the prevalence of diabetes mellitus subtypes in childhood cancer survivors: a systematic review protocol. *Adolesc Health Med Ther*, 2019. 10: p. 59-65.
9. Bansal, N., et al., Cardiovascular disease in survivors of childhood cancer. *Curr Opin Pediatr*, 2018. 30(5): p. 628-638.
10. Armenian, S.H., et al., Cardiovascular Disease in Survivors of Childhood Cancer: Insights Into Epidemiology, Pathophysiology, and Prevention. *J Clin Oncol*, 2018. 36(21): p. 2135-2144.
11. Ryan, T.D., R. Nagarajan, and J. Godown, Cardiovascular Toxicities in Pediatric Cancer Survivors. *Cardiol Clin*, 2019. 37(4): p. 533-544.
12. Boyne et al., Long-term risk of cardiovascular mortality in lymphoma survivors: A systematic review and meta-analysis. *Cancer Med*, 2018.7(9): p. 4801-13.
13. Oikonomou, E.K., et al., Development and Validation of a Clinical Score for Cardiovascular Risk Stratification of Long-Term Childhood Cancer Survivors. *Oncologist*, 2018. 23(8): p. 965-973.
14. Gramatges, M.M. and S. Bhatia, Evidence for Genetic Risk Contributing to Long-Term Adverse Treatment Effects in Childhood Cancer Survivors. *Annu Rev Med*, 2018. 69: p. 247-262.
15. Zaid, M.A., et al., Clinical and Genetic Risk Factors for Adverse Metabolic Outcomes in North American Testicular Cancer Survivors. *J Natl Compr Canc Netw*, 2018. 16(3): p. 257-265.
16. Cardio-Onco-Hematology in Clinical Practice. Position Paper and Recommendations.
17. Fine Licht, et al , Risk factors for cardiovascular disease in 5-year survivors of adolescent and young adult cancer: A Danish population-based cohort study.10.1002/cncr.32580 [19. Evenson KR,et al. Calibration of two objective measures of physical activity for children. *J Sports Sci*. 2008;26(14):1557-65.
19. Fiuza-Luces et al. Exercise Intervention in Pediatric Patients with Solid Tumors: The Physical Activity in Pediatric Cancer Trial. *Med Sci Sports Exerc*. 2017 Feb;49(2):223-230

Muchas gracias

blanca.herrero@salud.madrid.org