CAR-T en la LAL pediátrica

Joan Vinent Genestar, FEA, BCOP, BCPPS
Unidad de Farmacia Oncológica
Servicio de Farmacia
Hospital Sant Joan de Déu

Leucemia aguda linfoblástica (LAL)

- Cáncer más frecuente en niños (85% inmunofenotipo B)
- Incremento significativo de la supervivencia global (> 90 %)

St Jude Total Therapy studies.
Inaba H, Mullighan CH et al. 2020

Protocolos Soc. Esp. Hematología y Oncología Pediátrica
Inaba H, Mullighan CH et al. 2020

Eficacia de los tratamientos disponibles antes de los CAR-T en pacientes con LLA-B R/R

	Clofarabine mono ¹	Clofarabine + etoposide + cyclo ²	Clofarabine + etoposide + cyclo ³	Blinatumomab ⁴
Patients, N	61	25	17	70
≥3 prior regimens	62%	28%	NA	7%
ORR (CR+CRi)	20%	44%	76%	39%
Median OS	3.0 months	2.5 months	9.0 months	7.5 months
12 months OS	20%	30%	33%	40%
Early mortality (within 30 days)	25%	20%	NA	7%

1. Jeha S et al J Clin Oncol. 2006; 24:1917-23

2. Hijiya N et al. Blood 2011; 118: 6043 -6049

3. Locatelli F et al Br J Haematol. 2009;147(3):371-378

4. Von Stackelberg J et al. J Clin Oncol. 2016; 34:4381-4389

Inmunoterapia para la LAL

Marcadores de superficie de los linfocitos B

CD19, CD20 y CD22 no se expresan sobre las células madre hematopoyéticas o otros tejidos.

CAR-T en investigación en LAL pediátrica

Tisagenlecleucel (CTL019)

- **August 30, 2017:** approved for R/R B-cell precursor ALL (pediatric or young adult patients aged ≤ 25 y)¹

KTE-X19

- Currently in phase 2 testing

FHCRC CD19-4-1BB CAR

- Phase 1/2

UCART19

- Phase 1

CAR-T aprobados EMA

	Tisagenlecleucel (Tisa-cel, CTL019) Kymriah®	Axicabtagene Ciloleucel (Axi-cel, KTE-C19) Yescarta®	Brexucabtagene Autoleucel (KTE-X19) Tecartus®
US FDA Indication	Ped/young adult ALL Adult DLBCL	Adult LBCL	Adult MCL
CAR Type	CD19/4-1BB/CD3z	CD19/CD28/CD3z	CD19/CD28/CD3z
Costimulatory Domain	4-1BB (CD 137)	CD28	CD28
Vector	Lentivirus	Retrovirus	Retrovirus
Pivotal Trial	ELIANA (ALL), JULIET (DLBCL)	ZUMA-1 (LBCL)	ZUMA-2 (MCL)

Resultados de los tratamientos con CART

Diseño estudio ELIANA

Estudio de fase 2 multicéntrico, abierto y de un solo brazo para evaluar la eficacia y seguridad de tisagenlecleucel (CTL019) en pacientes pediátricos y adultos jóvenes con LAL B R / R (N = 75)

QT linfodepleción

- Fludarabina 30 mg/m² IV diaria x 4 días (1-4)
- Ciclofosfamida 500 mg/m² IV diaria x 2 días (1-2)

Dosis única CTL019 (2-14 días después de completar la QT linfodepleción):

- 0,2 a 5 x 10⁶ AR+ T cel/Kg (para pacientes ≤ 50 Kg)
- 0,1 a 2,5 x 10⁸ cel/Kg cel /Kg (para pacientes > 50 Kg)

- Objetivo principal: tasa respuesta completa (CR/CRi) a los 3 meses
- Objetivos secundarios: duración de respuesta, supervivencia libre de evento, supervivencia global, supervivencia libre de recaída

Maude SL et al. NEJM 2018.

ELIANA : resultados supervivencia libre de evento y supervivencia global

EFS for Patients With ALL at the First Infusion

Overall Survival for Patients With ALL at the First Infusion

Tasa de remisión (3 meses) : 82% (todos EMR-)

ELIANA: resultados SG con mayor seguimiento

OS Rates Among Infused Patients

- **12 month:** 76% (95% CI, 65-85)
- **18 month:** 70% (95% CI, 58-79)
- **24 month:** 66% (95% CI, 54-76)

	Events, n	Kaplan–Meier Medians, mo (95% CI)
All patients	25	NE (28.2-NE)

No. at Risk

All patients 79 76 73 68 67 62 55 52 47 42 39 26 21 14 9 5 2 0

Grupp SA et al . SHD 2018. Abstr. 895

ELIANA : resultados SLE con mayor seguimiento

- La mayoría de las recaídas ocurren en los primeros meses.
- Las recaídas son a menudo CD19 negativas (escape)

Grupp SA et al . ASH 2018. Abstr. 895

ELIANA: todos los subgrupos se benefician del tratamiento

Real world : Tisagenlecleucel en LAL pediátrica

blood advances

Real-world evidence of tisagenlecleucel for pediatric acute lymphoblastic leukemia and non-Hodgkin lymphoma *CIBMTR: Center for International Blood & Marrow Transplant Research*

Marcelo C. Pasquini,¹ Zhen-Huan Hu,¹ Kevin Curran,² Theodore Laetsch,³ Frederick Locke,⁴ Rayne Rouse,⁵ Michael A. Pulsipher,⁶ Christine L. Phillips,⁷ Amy Keating,⁸ Matthew J. Frigault,⁹ Dana Salzberg,¹⁰ Samantha Jaglowski,¹¹ Joshua P. Sasine,¹² Joseph Rosenthal,¹³ Monalisa Ghosh,¹⁴ Daniel Landsburg,¹⁵ Steven Margossian,¹⁶ Paul L. Martin,¹⁷ Manali K. Kamdar,¹⁸ Peiman Hematti,¹⁹ Sarah Nikiforow,²⁰ Cameron Turtle,²¹ Miguel-Angel Perales,²² Patricia Steinert,¹ Mary M. Horowitz,¹ Amy Moskop,¹ Lida Pacaud,²³ Lan Yi,²³ Raghav Chawla,²⁴ Eric Bleickardt,²⁵ and Stephan Grupp^{3,26}

N=255 (infused)

Disease Burden Impacts Outcomes in Pediatric and Young Adult B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia after Commercial Tisagenlecleucel: Results from the Pediatric Real World CAR Consortium (PRWCC)

Liora M. Schultz, MD, Christina Baggott, RN, PhD, Snehit Prabhu, PhD, Holly Pacenta, MD, Christine L. Phillips, MD, Jenna Rossoff, MD, Heather Stefanski, MD PhD, Julie-An Talano, MD, Amy Moskop, MD, Steven P. Margossian, MD PhD, Michael R Verneris, MD, Gary Douglas Myers, MD, Nicole Karras, MD, Patrick A. Brown, MD, Muna Qayed, MD MSc, Michelle Hermiston, MD PhD, Prakash Satwani, MD, Christa Krupski, DO, MPH, Amy Keating, MD, Rachel Wilcox, Cara A Rabik, MD PhD, Vanessa Fabrizio, MD, Michael Kunicki, Vasant Chinnabhandar, MD, A. Yasemin Goksenin, MD PhD MA, MPH, Kevin J. Curran, MD, Crystal L. Mackall, MD, Theodore W. Laetsch, MD

N=200 (185 infused)

Intention to Treat Analysis of Real-World Outcomes Following Tisagenlecleucel Therapy for Pediatric and Young Adult ALL through a National Access Programme

Sara Ghorashian, FRCPath, PhD, Caroline Furness, Michelle Cummins, John A Snowden, BSc (Hons), MBChB, MD FRCP, FRCPath, Maeve A O'Reilly, MBBChBAO, Claire Roddie, PhD MD, Lorna Neill, Emma Nicholson, Caroline Besley, MBBChir, MRCP, MRCP, Sridhar Chaganti, MD PhD MRCP, FRCPath, John Gillson, MD, Antonio Pagliuca, MBBS, MA, FRCP, FRCPath, Anna Castleton, FRCPath, Amit Patel, MBBS, PhD FRCPath, MRCP, Peter Clark, MA MDFRCP, Robert Fernley, Robert Wynn, MD, Ajay Vora, MD, David I. Marks, MB, MS, FRACP, PhD FRCPath, Geoff Shenton, Persis J Amrolia, FRCP, FRCPath, PhD, Denise Bonney, Rachael E Hough, MD

N=66 (60 infused)

Complete data capture of eligible UK patients through national access system

Real world : Tisagenlecleucel el LAL pediátrica

	N (infused)	CR / CR i (%)	12 mo EFS (%)	12mo OS (%)	12mo DOR (%)	CD19- Relapse rate
ELIANA	79	82 64/65 MRD-	57	77	67	14/19 74%
CIBMTR	255	86 115/116 MRD-	52.4	77	61	
PRWCC	185	85 79 (ITT)	51	72	63	22/52 42%
UK	60	95 36/39 MRD-	68	86		4/10 40%
		85 (ITT)	61 (ITT)	78 (ITT)		

CIBMTR: Center for International Blood & Marrow Transplant Research

Pediatric Real World CAR T Consortium (PRWCC)

Real world : Tisagenlecleucel el LAL pediátrica

Pediatric Real World CAR Consortium (PRWCC)

Schultz, ASH 2020. Abstr. 468

Identificación y manejo de las toxicidades de las CAR-T

ELIANA: efectos adversos

Table 3. Adverse Events of Special Interest within 8 Weeks after Infusion, Regardless of Relationship to Tisagenlecleucel.*

Type of Event	Any Grade (N=75)	Grade 3 (N=75)	Grade 4 (N=75)
	<i>number of patients (percent)</i>		
Any adverse event of special interest	67 (89)	26 (35)	30 (40)
Cytokine release syndrome	58 (77)	16 (21)	19 (25)
Neurologic event	30 (40)	10 (13)	0
Infection	32 (43)	16 (21)	2 (3)
Febrile neutropenia	26 (35)	24 (32)	2 (3)
Cytopenia not resolved by day 28	28 (37)	12 (16)	12 (16)
Tumor lysis syndrome	3 (4)	3 (4)	0

Efectos adversos de las CAR T

Brudno JN et al. Blood 2016.

Neelapu SS et al. Nat Rev Clin Oncol 2018

More common Less common

Síndrome de liberación de citoquinas (SLC)

Gradación del SLC (ASTCT)

Parameter	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
Fever	Temp $\geq 38^{\circ}\text{C}$	Temp $\geq 38^{\circ}\text{C}$	Temp $\geq 38^{\circ}\text{C}$	Temp $\geq 38^{\circ}\text{C}$
with				
Hypotension	None	Not requiring vasopressors	Requiring a vasopressor with or without vasopressin	Requiring multiple vasopressors (excluding vasopressin)
and/or				
Hypoxia	None	Requiring low-flow nasal cannula or blow-by	Requiring high-flow nasal cannula, facemask, nonrebreather mask, or Venturi mask	Requiring positive pressure (eg, CPAP, BiPAP, intubation, and mechanical ventilation)

- Objetivo: prevenir daño orgánico
- Evitar retraso en soporte, peores resultados: considerar paso a UCI con un grado 2
- Manejo hipotensión: fluidos IV, uso de vasopresores
- Uso de fármacos anti interleuquina, no reducen la respuesta antitumoral

Lee DW et al . Biol Blood Marrow Transplant. 2019

Inhibición de las interleuquinas

	Tocilizumab	Siltuximab	Anakinra
Description	Humanized IL-6 receptor antagonist	Chimeric anti-IL-6	Recombinant human IL-1 receptor antagonist
Mechanism of Action	Inhibits IL-6 mediated signaling by binding to both soluble & membrane bound human IL-6 receptors	Binds to human IL-6 preventing an interaction with both soluble & membrane bound IL-6 receptors	Competitive antagonist of the IL-1 receptor, regulates actions of IL-1 by prevention of signal transduction
Dose	< 30 kg: 12 mg/kg ≥30 kg: 8 mg/kg Max dose of 800 mg	11 mg/kg	<i>Under investigation</i>
	Every 8 hours, max 4 doses total		
Administration	IV over one hour No premedication needed	IV over one hour	<i>Under investigation</i>

Neelapu SS et al Nat Rev Clin Oncol. 2018

ICANS (*immune effector cell associated neurotoxicity syndrome*)

- Disminución atención, alteración lenguaje, confusión, desorientación, temblores, convulsiones y encefalopatía.
- Fisiopatología no del todo establecido, síndrome de fuga capilar y disrupción de BHE, otras causas.
- Inicio 4-6 días, y duración 14-17 días, +/-SLC.
- Autolimitante y la mayoría de pacientes recuperan sin secuelas neurológicas a largo plazo.
- Profilaxis con levetiracetam .

ICANS (Immune efectos cell-associated neurotoxicity syndrome)

Neurotoxicity Domain	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
ICE score*	7-9	3-6	0-2	0 (patient is unarousable)
Depressed level of consciousness	Awakens spontaneously	Awakens to voice	Awakens only to tactile stimulus	Patient is unarousable or requires vigorous or repetitive tactile stimuli to arouse; stupor or coma
Seizure	N/A	N/A	Any clinical seizure focal or generalized that resolves rapidly or nonconvulsive seizures on EEG that resolve with intervention	Life-threatening prolonged seizure (> 5 mins) or repetitive clinical or electrical seizures without return to baseline in between
Motor findings	N/A	N/A	N/A	Deep focal motor weakness such as hemiparesis or paraparesis
Elevated ICP/cerebral edema	N/A	N/A	Focal/local edema on neuroimaging	Diffuse cerebral edema on neuroimaging; decerebrate or decorticate posturing; or cranial nerve VI palsy; or papilledema; or Cushing's triad

Lee DW et al. Biol Blod Marrow Transplant 2019

Recaída post infusión CAR T

Recaída post infusión CAR T

- Recaída CD19+ (tempranas), falta de persistencia de los CAR-T
 - Dominio co-estimulador : 4 -1BB > CD 28
 - Rechazo inmunomediado (componente murino)
 - CAR T humanizados
 - Agotamiento de la célula T
 - Producción: pacientes intensamente tratados
 - Avanzar la aféresis a una etapa más temprana
 - Mejora de las técnicas ex vivo

Recaída post infusión CAR T

- Recaída CD19 -, pérdida del antígeno diana durante la aplasia de linfos B:
 - Mutaciones en los exones 2-5 de CD19
 - Tráfico inefectivo de CD19 de membrana
 - Previa tratamiento con blinatumomab o inotuzumab ozogamicina ¿?
 - Múltiple o bispecifico CAR T (eg CD19/22)

CAR T duales

CD19/CD22 Cocktail
(Wang, N et al Blood 2019)
51 infused – 96% CR
PFS 13.6 months

Short In Vivo persistence of CAR T cells

24 relapses
1 CD19-CD22dim
23 CD19+CD22+

Nirav Shah et al, Front in Onc 2018

AUTO3 - Great Ormond Street
(Amrolia PJ, et al. ASH 2019)

7/7 MRD neg CR

Short persistence is seen
CD19+antigen relapse seen

Stanford
(Schultz L et al. ASH2019)

92% MRD negative CR

Short persistence is seen
CD19+ relapses

Beijing
(Dai, H et al. J Hem Onc 2020)

6/6 MRD negative CR

5/6 **lost persistence** prior to 6 months

ELIANA: Tisagenlecleucel en LAL-B niños, adolescentes y adultos jóvenes recaída o refractaria

	N (infused)	CR / CR i (%)	12 mo EFS (%)	12mo OS (%)	12mo DOR (%)	CD19- Relapse rate
ELIANA	79	82 64/65 MRD-	57	77	67	14/19 74%
CIBMTR	255	86 115/116 MRD-	52.4	77	61	
PRWCC	185	85 79 (ITT)	51	72	63	22/52 42%
UK	60	95 36/39 MRD- 85 (ITT)	68 61 (ITT)	86 78 (ITT)		4/10 40%

- La mayoría (73,7%) son CD19- que ocurren en contexto de persistencia de aplasia linfos B.

Algoritmo de tratamiento LAL B primera recaída

Algoritmo de tratamiento LAL B 2ª recaída o refractaria

Conclusiones

- La tisagenlecleucel ha demostrado en ensayos clínicos y *real world* inducir remisiones rápidas y duraderas siendo una potencial terapia definitiva en pacientes con remisiones prolongadas.
- Presentan un mecanismo de acción y un perfil de toxicidad únicos que requieren una monitorización estrecha y terapia de soporte agresivo y manejo en centros especializados.
- Es necesario conocer la seguridad y eficacia a largo plazo, y vencer algunos hándicaps como la pérdida del CAR T o vencer los mecanismos de resistencia.

Gracias

Joan Vinent Genestar

jvinent@sjdhospitalbarcelona.org