II JORNADA

CONTROVERSIAS EN

FARMACIA

NEUROPSIQUIÁTRICA

ORGANIZA

PATROCINA

Adecuación terapéutica en Farmacia Neuropsiquiátrica

*Santos Navarro de Lara
S^o Farmacia. Hospital Can Misses. Ibiza*

Madrid, 6 de febrero de 2020

ADECUACIÓN TERAPÉUTICA

Concepto adecuación terapéutica

ORGANIZA

PATROCINA

Proceso de elección de la TERAPIA DEL PACIENTE en el que, mediante una ADECUADA INDICACIÓN, PRESCRIPCIÓN, DISPENSACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO, se CONSIGUEN UNOS RESULTADOS EN SALUD APROPIADOS A LAS CONDICIONES Y CIRCUNSTANCIAS DEL PROPIO PACIENTE y del conjunto de la comunidad.

Villafaina y Gavilán, 2011

La MEDICACIÓN de un paciente puede considerarse como ADECUADA cuando cada uno de los FARMACOS que conforman el TRATAMIENTO del paciente es CLINICAMENTE CORRECTO Y SEGURO (incluyendo dosificación, vía de administración y duración), teniendo en cuenta que tanto la INDICACIÓN como la SEGURIDAD pueden variar en función del CONTEXTO CLÍNICO Y AMBIENTAL. Greenwald, 2010

Consiste en ADAPTAR LA FARMACOTERAPIA a la SITUACIÓN FISIOPATOLÓGICA ACTUAL del paciente. Navarro, 2019

Concepto medicación inapropiada

Un fármaco se considera inapropiado cuando se utiliza:

(i) En dosis excesivas (incluida duplicidad terapéutica); o

(ii) Por una duración excesiva; o

(iii) Sin un seguimiento adecuado; o

(iv) Sin indicaciones adecuadas para su empleo; o

(v) En presencia de efectos adversos que indiquen que la dosis debe reducirse o el fármaco debe retirarse; o

(vi) Cualquier combinación de las razones anteriores.

“El riesgo de sufrir un acontecimiento adverso con un fármaco supera su beneficio clínico, especialmente si existen evidencias a favor de una alternativa más segura o eficaz”

DEPRESCRIPCIÓN/ REDUCCIÓN GRADUAL DE DOSIS

ORGANIZA

PATROCINA

Deprescripción

- El cese o modificación de la dosificación de un medicamento de larga duración bajo la supervisión de un profesional, pudiendo ser sustituido o no por otro medicamento, todo ello tras una valoración individualizada para adaptar el tratamiento a cada persona y sus circunstancias.

Antidepresivos
Hipnótico-sedantes
Antipsicóticos

- En Farmacia Neuropsiquiátrica

Reducción
gradual de
dosis

- “Es la disminución progresiva de la dosis de un fármaco para determinar si la sintomatología asociada a una condición clínica concreta, puede controlarse con una dosis inferior o si el medicamento se puede interrumpir o retirar, tras la resolución o mejora de la condición, que originó su prescripción”
- Ejemplo: empleo de neurolépticos en los Síntomas Psicológicos y Conductuales asociados a la Demencia

JUSTIFICACION

Consecuencias de la polimedicación y del uso de medicamentos inapropiados

Consecuencias clínicas

- Disminución adherencia terapéutica
- Efectos adversos a los medicamentos
- Interacciones fármaco-fármaco y medicamento-enfermedad
- Riesgo de hospitalización, de prolongación de la misma y de reingreso
- Riesgo de caídas y de lesiones provocadas por las mismas
- Disminución funcionalidad física
- Deterioro calidad de vida relacionada con la salud
- Aumento de la morbilidad
- Aumento de la mortalidad

Consecuencias legales

- Responsabilidad civil en caso de daños resarcibles
- Responsabilidad penal por imprudencia o dejación de funciones que ocasionen daño a la vida o a la integridad física

Consecuencias éticas

- Deterioro relación clínica
- Pérdida de confianza en la asistencia sanitaria

Consecuencias sociales

- Alteraciones en el rol y funciones sociales del individuo

Consecuencias económicas

- Gastos directos: gasto farmacéutico (hospitalario y por receta), consultas y hospitalizaciones por efectos adversos, pruebas diagnósticas, etc.
- Costes sanitarios no directos: cuidados y adaptaciones domiciliarias por discapacidades
- Costes indirectos: productividad perdida asociada al daño producido por los medicamentos
- Costes intangibles: daño moral, disminución calidad vida, deterioro bienestar, etc.

Consecuencias en la política sanitaria y en la salud pública

- Medidas legislativas y administrativas
- Políticas y planes de salud

BARRERAS DEL PROCESO DE ADECUACION TERAPÉUTICA

ORGANIZA

PATROCINA

Sistema sanitario y sociedad

- Guías de práctica clínica y recomendaciones de carácter medicalizador
- Sistemas de Salud impersonales, poco centrados en los pacientes
- Prescripción íntimamente asociada al acto clínico
- Múltiples profesionales involucrados en la atención del mismo paciente (fragmentación de la atención)
- Medicina defensiva y la prescripción inducida

Médico

- Inercia sobre terapéutica
- Reticencias a cambiar medicamentos prescritos por otros facultativos
- Dificultad en mantener una formación actualizada
- **RELACION MEDICO –PACIENTE**
- No evaluar posibilidades de deprescripción con el paciente/familia
- No tener en cuenta la perspectiva del paciente

Paciente

- Percepción de abandono
- Resistencia a abandonar medicamentos que viene tomando durante mucho tiempo

¿Cómo realizar una adecuación terapéutica?

Figura 1. Fases del proceso de deprescripción de medicamentos. Adaptado de Hardy et al.¹².

ESTRATEGIAS PARA DETECETAR MI

Tabla 1. Herramientas disponibles para la optimización de la prescripción de medicamentos.

Implícitas	Explícitas
Improve Prescribing in the Elderly Tool (IPET; Canadá, 1997): describe los 14 errores más frecuentes identificados por un panel de expertos en pacientes hospitalizados mayores de 70 años.	Criterios Beers (1991): describe un listado de medicamentos apropiados para ser utilizados con seguridad en las personas mayores.
Medication Appropriateness Index (MAI; Canadá, 1992 y 1994): describe diez criterios relacionados con costos, dosis incorrecta y duración del tratamiento.	Screening Tool of Older Persons Prescriptions - Screening Tool to Alert doctors to Right i.e appropriate indicated Treatment & (STOPP- START; Irlanda, 2008): describen 65 y 22 criterios, respectivamente.
Assessing Care of Vulnerable Elders (ACOVE; EE.UU.)	Criterios de uso inapropiado en Australia (2008)
Medication Screening Questionnaire (MSQ; EE.UU., 2011)	Medicación Potencialmente inadecuada en ancianos (Francia; 2007)
	Norwegian General Practice (NORGEP; Noruega, 2009)

Los **métodos implícitos** parten de una evaluación clínica del paciente y su régimen terapéutico. Basándose en dicha evaluación, se realiza el juicio clínico de si los fármacos prescritos son o no apropiados. (MAI, ACOVE)

Los **métodos explícitos** permiten detectar prescripción inadecuada y fármacos que deben evitarse o que no están indicados para determinadas patologías, condiciones todas ellas asociadas a problemas relacionados con los medicamentos y a morbilidad debida a fármacos. (Beers, STOPP/START)

Revisión Criterios Beers/ STOPP en relación a psicofármacos

Criterios Beers (1991, 1997, 2003, 2012)

Central Nervous System

Tertiary TCAs, alone or in combination:

Highly anticholinergic, sedating, and cause orthostatic hypotension;

Antipsychotics, first- (conventional) and second- (atypical) generation

Increased risk of cerebrovascular accident (stroke) and mortality in persons with dementia.

Avoid use for behavioral problems of dementia unless non-pharmacologic options have failed and patient is threat to self or others.

Thioridazine Mesoridazine

Highly anticholinergic and greater risk of QT-interval prolongation.

Benzodiazepines

Older adults have increased sensitivity to benzodiazepines and decreased metabolism of long-acting agents. In general, all benzodiazepines **increase risk of cognitive impairment, delirium, falls, fractures**. May be appropriate for seizure disorders, benzodiazepine withdrawal, ethanol withdrawal, severe generalized anxiety disorder, periprocedural anesthesia, end-of-life care.

Avoid benzodiazepines (any type) for treatment of insomnia, agitation, or delirium.

Nonbenzodiazepine hypnotics: Zolpidem

Benzodiazepine-receptor agonists that have adverse events similar to those of benzodiazepines in older adults (e.g.,

Avoid chronic use (>90 days)delirium, falls, fractures);

STOPP Screening Tool of Older People's potentially inappropriate Prescriptions (2008)

B.Sistema Nervioso Central y psicofármacos

1. **Antidepresivos triciclicos (ATC)** con demencia (*riesgo de empeoramiento del deterioro cognitivo*)

3. ATC con trastornos de la conducción cardiaca (*efectos proarrítmicos*)

7. Uso prolongado (mas de 1 mes) de **benzodiazepinas de vida media larga (clordiazepoxido, clorazepato) o benzodiazepinas con metabolitos de larga acción (como diazepam)** (*riesgo de sedación prolongada, confusión, trastornos del equilibrio, caidas*)

8. **Uso prolongado (mas de 1 mes) de neurolepticos como hipnoticos a largo plazo** (*riesgo de confusión, hipotensión, efectos extrapiramidales, caidas*)

9. **Uso prolongado de neurolépticos (mas de 1 mes) en el parkinsonismo** (*es probable que empeoren los síntomas extrapiramidales*)

10. **Fenotiazinas** en pacientes con epilepsia (pueden disminuir el umbral convulsivo)

11. Anticolinergicos para tratar los efectos secundarios extrapiramidales de los neurolepticos (*riesgo de toxicidad anticolinérgica*)

12. **ISRS** con antecedentes de hiponatremia clinicamente significative (*hiponatremia inferior a 130 mmol/l no iatrogénica en los 2 meses anteriores*)

H.Fármacos que afectan negativamente a los propensos a caerse (1 o más caidas en los últimos 3 meses)

1. **Benzodiazepinas** (*sedantes, pueden reducir el sensorio, deterioran el equilibrio*)

2. **Neurolepticos** (*pueden causar dispraxia en la marcha, parkinsonismo*)

ORGANIZA

PATROCINA

- Esto no es un “invento o una moda reciente” se está publicando desde hace más 25 años
- Se intenta organizar toda la evidencia disponible para presentarla de forma que responda a las principales preguntas que se nos plantean sobre la RGD de psicofármacos

1. ¿Por qué se debe intentar una RGD?
2. ¿En qué situaciones se debe proponer y con qué periodicidad?
3. ¿Cuándo estaría clínicamente contraindicada?
4. ¿Cómo hacer la RGD y que seguimiento hacer al paciente?

Recomendaciones para el empleo de Antipsicóticos en SPCD en el Área de Salud y estrategias de retirada

Dirigido a Facultativos del Hospital y de Atención primaria. Médicos de centros sociosanitarios, de media y/o larga estancia del Área de Salud de Ibiza y Formentera

REDUCCIÓN GRADUAL DE ANTIPSICÓTICOS

1. ¿Por que intentar una RGD/retirada?

1. Antipsicóticos está asociados a $\uparrow$ del riesgo de efectos adversos (EA) graves como: Trastornos metabólicos (diabetes), aumento de peso, efectos extrapiramidales, prolongación intervalo QT efectos anticolinérgicos, somnolencia, mareo, hipotensión ortostática, alteración de la marcha, riesgo de caídas $\rightarrow$ fractura cadera.
2. Pacientes con edad avanzada son más sensibles a los EA, también aumenta el riesgo en pacientes con Enf. Parkinson, Demencia vascular, y Demencia por cuerpos de Lewi. En general, si coexiste un diagnóstico de Demencia aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad.

2. ¿Qué beneficios cabe esperar?

1. Reducción del riesgo de mortalidad asociada a eventos cardiovasculares. [OR: 1,54-1,7]* (el tratamiento con ASG aumenta el riesgo de mortalidad entre un 54-70 % con respecto al grupo tratado con placebo)
2. Mejorar el estado de alerta, la marcha, disminuir el riesgo de caídas $\rightarrow$ fracturas, los efectos extrapiramidales, sedación, hipotensión ortostática, etc...

* Ballard CG, Waite J, Birks J. Atypical antipsychotics for aggression and psychosis in Alzheimer's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD003476.DOI: 10.1002/14651858.CD003476.pub2.

REDUCCIÓN GRADUAL DE DOSIS ANTIPSICÓTICOS

A. ¿En qué situaciones se debe de plantear?

1. En el tratamiento de los SPCD (psicosis, agresión y agitación), cuando la duración es ≥ 3 meses (y los síntomas se han controlado, o no ha habido respuesta a la farmacoterapia). El efecto de estos fármacos en el control de los síntomas a largo plazo parece ser pequeño o moderado(1)
2. Cuando se están empleando en el tratamiento del Insomnio primario (independientemente de la duración del tratamiento), o del Insomnio secundario, cuando se ha tratado la causa subyacente
3. Ante la presencia de efectos adversos graves

REDUCCIÓN GRADUAL DE DOSIS ANTIPSICÓTICOS

ORGANIZA

PATROCINA

- a. Si se está empleando un antipsicótico para tratar los SPCD, **la RGD se puede considerar clínicamente contraindicada si:**
 1. Si la sintomatología vuelve a aparecer o empeora tras el intento más reciente de una RGD; y
 2. Cuando el médico ha registrado una justificación clínica por la que cualquier intento de reducción de la dosis adicional en ese momento sería perjudicial para la función del residente o podría empeorar los trastornos conductuales.
- b. Cuando se están empleando en el tratamiento de un Trastorno Psiquiátrico diferente a los SPCD; como: Esquizofrenia, Trastorno Bipolar, Depresión refractaria o con características psicóticas, Trastornos del neurodesarrollo o discapacidad intelectual, etc...Si se plantea una RGD por un efecto adverso grave se consultará con Psiquiatra de referencia.
- c. **Indicaciones exentas de RGD:** trastornos conductuales asociados al Sind. Tourette, alteraciones del movimiento en la Enf. De Huntington, Hipo resistente, náuseas y vómitos asociadas a cáncer o a la quimioterapia, como adyuvantes para el tratamiento de confort al final de la vida (sedación paliativa)

REDUCCIÓN GRADUAL DE DOSIS ANTIPSICÓTICOS: ¿cómo y con qué seguimiento?

De forma **consensuada con Médico, paciente, familia y personal sanitario**

1. **En SPCD** reducir 25-50% de la dosis cada 1-2 semanas. Finalizando el tratamiento tras 2 semanas de administrar la dosis mínima. La RGD puede durar entre 4-6 semanas.
 - Si los SPCD vuelven a aparecer:
 - ✓ **Considerar el manejo con medidas no-farmacológicas** Terapia conductual, actividades programadas, evaluar causas subyacentes como dolor, infección, depresión, estreñimiento, factores ambientales como la luz, ruidos, fármacos que agraven el cuadro
 - ✓ **Reiniciar el AP a la menor dosis efectiva, y volver a realizar una RGD a los 3 meses**
 - ✓ **Volver a la dosis previa y reducir un 10% de la dosis a intervalos mensuales**
2. **En el caso de empleo de AP a bajas dosis para el Insomnio** (Ejm: Quetiapina 25-50 mg, Olanzapina 2,5 mg, Risperidona 0,25 mg), no sería necesario una RGD, se puede retirar directamente
 - Si reaparece el insomnio:
 - ✓ **Considerar el manejo con medidas no-farmacológicas:** Higiene del sueño, Terapia cognitivo-conductual de control de estímulos
3. Seguimiento o monitorización del paciente cada 1-2 semanas mientras dure la RGD
4. Si se parte sintomatología severa se debe adaptar la RGD y la monitorización a las necesidades individuales

Pan YJ, Wu CS, Gau SS, Chan HY, Banerjee S. Antipsychotic discontinuation in patients with dementia: a systematic review and meta-analysis of published randomized controlled studies. *Dement Geriatr Cogn Disord*. 2014;37:125–40.

Bjerre LM et al. Deprescribing antipsychotics for behavioural and psychological symptoms of dementia and insomnia. *Can Fam Physician*. 2018; 64(1): 17-27.

Algoritmo de retirada gradual de dosis de antipsicóticos

G CONSELLERIA
 O SALUT I CONSUM
 I ÀREA SALUT
 B EIVISSA I FORMENTERA

Reducción progresiva de antipsicóticos

La Unidad de Seguridad del Paciente dedica diciembre, dentro de la campaña Los 12 del año a la reducción progresiva de antipsicóticos. En alteraciones conductuales asociadas a demencia controladas, valorar realizar una reducción gradual de dosis de antipsicóticos al menos dos veces al año, con al menos 4 meses entre ambas.

ADECUACIÓN TERAPEUTICA

- **Esto “no es la panacea”**; la palabra **panacea** proviene de la voz griega panakos y significa **'remedio para todo'**
- **Tampoco** pretende sustituir el “juicio clínico” individual de un médico con un paciente concreto
- Pero si pretende ser una **“herramienta de apoyo en la toma de decisiones clínicas para intentar reducir la morbi-mortalidad asociada al empleo de psicofármacos** con el propósito de mejorar los resultados en salud global”

ORGANIZA

PATROCINA

II JORNADA
**CONTROVERSIAS EN
FARMACIA
NEUROPSIQUIÁTRICA**

ORGANIZA

PATROCINA

¡Gracias por vuestra atención!

*Santos Navarro de Lara
S^o Farmacia. Hospital Can Misses. Ibiza*

Madrid, 6 de febrero de 2020